





Désignation: Sauvaget

Clos 5 Planche 14 Côté S No M

Vigueur: 2

Date de mâturité: 2017.859

Chargé:

S. 14

Jailles

J

Désignation Journage V

Clos 5 Planche 14 côté 5 No 14

Vigueur: 3

Date de mâturité 8 - 8 - 60

Charge: P=0

30

pésignation: Sauvagel

Clos & Planche 14 côté & N°11

Vigueur: 2

Date de mâturité: 21.8,61

Chargé: Po

S. 13

faible2

40

50

Designation: Sawaget

Clos & Planche 14 Rang & Souche 1-1

Vigueur: & Ule 6.8-62

Date de maturité: 21-2.62

Pourriture: 6

BAIE: G-M-P-L-M-C

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

saveur: &-m-ar-fox-herb.

s 1 M Disc-sph-ell-ov.
Obov-cyl-fus.

s 2 M

s 3 / Savec pépins-apyrène

s 4 6 jus: inc-seleré.

s 5 2

pesignation: Sawada

Clos & planche M - Rang & M Souche

Vigueur: Ma A

Date de Véraison: 5.8.63

Date de maturité: 15.8

Fourriture: 15.8

GRAPPE - G - P - L - H - C.

BAIE: TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge Saveur: 8 - m - ar - fox - herb

8:9 disc. - sph. - ell. - Ov.


Obov. - cvl. - fus.

3 2 5

avec pépins - apyrène

8 3 4 3 jus: inc. - coloré

5 5 0



	Année 1989 N° ,, Planche .					Sau 14.	sag	et 11.		Coté						
The same was made along from	i Nembre	1		real first and a real first and a real grant and a real g		D 1	4 5	T E	S		Andre grade plates devel -	Marie State State States in		====	===	==:
! !	i Total	16.3	1	1	1					1		!		1		-
1 1 1 1 1 2	1 H 2	· 3,			1	2 :			v	1	# .p	!!!	a		٥,	0
ille 3	1 %	[\$	1	1 3 0	1 1	0 (0	1	0 0	1 ,		1		0
1 4	1 2 .	1 0 0	100	1	Î	v	. [0	٥	Ī	. ,	1 .	٥	1		v
Déc! >5	1 4 0		1	1 0 0	!	4 3	!	13	ış.	1		1 .	ю	1		۵
			D le	16.3.	54							1				

	Nombre!			DATES
!	!	9 3	141.3	
1 ;	7	0	! 0	
2 !	2	2	12	
3	2	2	12	
4	2	0	11	
5	2	0	!2	De 11.13.60 9

Année : 1961

Emplacement: 5 14811 Sawaget

!		Nombre total!					DATE				!	
!	1	10	0	! 1	1 1	!	•	1	Į.	!	1	
Jail	3 4	4 5	0	14.	! ! ! ! ! ! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	#	!	1 1 1 1	!	
3000	6	!!		1	1 1	06!	6. 3-61 K	!	1	!		
	8			!	1 1 1 1 1	!	0		1	!!!		
	9	!!!!		!!!!!	! ! ! ! ! !	!	!!!!	? ? ?	! !	! ! !	!	
	!	! !		!	! !	!	!	!	!	!		

	Nombre					D Å	T	3						
	total	30,3	1 5-4 1 1		1			1		1		1		
1	.6.	11.	6 x		. 1		. 1		1			1	1	
2	·4.	3.	1 .4 . x!		. 1		. 1		. 1	,		1	1 .	н
3	.6.	.0.	.6.x		. 1		. 1		. !			1	1 .	
4	.6.	.0.	5 , 1	٠	. !		. !		. !	+	٠		1 .	
5	٠٤٠	.1.	i di axi		. 1	•	. 1		. !			1 .	1 .	

+2

3 = 丰

Désignation: Sauvaget

VASSAL Planche 7 Côté S Nº 17 Souche 123 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

= 9 JUIN 1955

Désignation: Sauvaget s. 3.5 3 souchs référentes VASSAL Planche 7 côté S Nº 17 Souche 12(3)45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeu- .
 ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9 .
- 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

No ordre

3 souches 7

Désignation: Sauraget

VASSAL Planche 7 côté S Nº 17 souche 12 B) 4 5

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre (4) séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré à un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Twel

lou le juille woulte

Nº ordre

Désignation: Sauvaget 1.3-5 A3-Planche Icôté S Nº 17 souche 123 45

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 28 à lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- à gques poils marife 31 - totalement 1 - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU JOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9 ·
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 3 à raies colo-rées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- ps defluir C. Samson .20,5,5 i 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

F

Nº ordre

Désignation: Souvaget 13

VASSAL Planche 7 côté S Nº 17 souche 12345

(F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré (7) à raies 2 vert 3.

 ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune (2) rouge clair 3 rouge foncé 4 · rouge dais a Calase.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Twel 17-6-54 Nº ordre

3 souches +

Désignation : Sauvager

VASSAL Planche > côté \$ Nº 17 souche 128 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

= 9 JUIN 1955

Timel

No ordre

Désignation Sauvaget 33 VASSAL planche 7 côté S Nº 17 souche 1 2(3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Pace inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux (7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte (1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 5 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiolo/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

C. Samson

Nº ordre

Saurager (7817.03)

Désignation

VASSAL planche 14c8té S No M souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5' - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . pliesée au point pétiolaire 6
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1, vert franc O- vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8,
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

No d'ordre

Désignation

Samaget

VASSAL

5 Flanche 14 coté S No 11 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédonoule non visible (7)- visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forms: discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 evelde 3 troncovolde 4 obcvolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale ; régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région Ombilicale déprimée 6 non déprimée (2)
- 29 A jus incolere (1) coleré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4- énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7- molle 8.
- 30 A saveur neutre) fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen(2) court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5)- long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile(2).

Boural 62

Dénomination ... Sauvaget 1. côté A. Rang Souche 7-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). 11 : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 2 3 4 3 6 7 8 9
- 14 Angle L₃ et L'₃ ①-2-3
- 15 Largeur du S.P. 1 2 3 4 5
- 16 Direction du bord du Limbe 1 2 3 au point pétiolaire.
- 17 L₁ curviligne 1 rectiligne 2
 L₂ curviligne 3 rectiligne 4
- 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 0-2-3

Forme 4-5

Mėdiane/Base 6-0-8

Nº d'ordre: .0.10.6.01 . Nº dossier:		п
Désignation:		Π.
Origine: Sauvaget ?		Ph.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bon	: :Médiocre
· · ·		
1 - Angle des nervures 1 - 2 - 3	•	* * *
2 - L ₁ /L		ia ⁴ 0 0
3 - L ₂ /L		
4 - Lobes		
5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3		
6 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3	•	0 • •
7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	•	
8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 6	•	÷ • •
9 - Dents : forme	ь	o • o
10 - Dents : Méd./B 1 - 2-6		6 0
11 - Angle lob. term 1 - 2 - 3	o	
12 Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3		0 0 0
13	,	

Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 1999

Code clone: 01

Observateur:

Code cépage: 0106 Nom cépage :

SAUVAGET N

Emplacement: 2R4 x 91.95

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5- tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	21		12.3	0	
2					
3	Н	12.3	16.3	1	
4	Н	12.3	16.3	1	
.5					
Moyenne	مار		Dle 14.3.99	2	2

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles
24.5	28.5		27.7	3.8	24.8	(0.7 505)	(017300)

Formulaire de description 2/8 (floraison)

1993 Année :

Code introduction: 01

Observateur: TL

Code cépage : 106

Nom introduction: Sauvaget N

Emplacement: 2 RH 191-95

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte (7)

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1) en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 -

forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5) - forte 7 - très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1)- jaune 2 - plages bronzées 3 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3)moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible (3)moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible/3)moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées(1)- en gouttière 2 - autre 3

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 203 - moyenne 203 - très forte 204 Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212- autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan(1) en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225. Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 -

très forte 219. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 -

plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes (233)

Formulaire de description 3/8 (floraison)

Année: 1939

Code cépage : 106 Nom introduction: souwaget N

Code introduction:

Observateur: TL

Emplacement: 2 Rus 31-95

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé(1) demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9 oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible(3)- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2)- rouge 3.

oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2)- rouge 3.

Voir mileure

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1- présence 9

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence 1) présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible Ty moyenne 5 - forte 9.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1)- moyenne 5 - forte 9

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1) - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) D- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud (1) - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1)- 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4. oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 - présence 9

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie(1)- côtelée 2.

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2.

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1)- rouge clain 2)- rouge foncé 3 - vert 4.

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3.

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année:

1999

Code introduction: 1

Code cépage: 0106 Nom introduction: Souwaget N

Observateur: TL

Emplacement: 2 R4 191 95

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3)- moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq(3) sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3) vert moyen 5 - vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 1 - point pétiolaire

rouge 2- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 1) point pétiolaire rouge 2

- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II): absente 1)- présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 1) - présente 9

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) :

nulle ou très faible 1 - faible 3)- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3)- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3) moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1) - présente 9.

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1) - présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3) égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

[sinus pétiolaire : ouverture = 1-2-9-4-5-6 / forme = (U) accol. – V / dent = oui-non / dégarni = non-parlois-oui]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5) élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1) faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré(2) coloré 1.

Formulaire de description 5/8 (maturité) Année: 1999 Observateur: +L Code cépage: 906 Code introduction: 1 Nomintroduction: Sauvaget W Emplacement: 2 R4 A 91-95 Grappe oiv 202 longueur : très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5/longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): oiv 203 largeur : très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 5large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 15 oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne(5)- compacte 7 - très compacte 9 oiv 206 longueur pédoncule : très court (<3 cm) 1) court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7. - per en and vinil oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2)- en entonnoir 3. oiv 209* présence d'un aileron : absent 1)- une à trois ailes 2 - plus de trois ailes 3. Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7) très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 18 oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3) oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3)- ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6) oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2) oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5)- forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3)- moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9. oiv 229 ombilic : peu apparent 1 - apparent 2. oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1 colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2 oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5)- long

Vassal: 000-11 grappe: axe de la rafle: non coloré 2) coloré 1. 000-18 région ombilicale : déprimée 1 - non déprimée (2)

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9

Millerandage: nul à très faible 1)- faible 3 - moyen 5 - fort 7 - très fort 9

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 3 - difficile 7 - très difficile 9

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1/2 - présentes 2.

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: .1399

Observateur: TL

Code cépage: 0106

Code introduction: 01

Nom introduction: Sawaget N

Emplacement: 2R4331_95

Sarment

oiv 101 section transversale: circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie(1) - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre(2) rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1)- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence(1)- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence T, présence 9.

oiv 351 vigueur: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3)- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3- moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue:

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5)-

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue:

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens(2) saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

Formulaire de description 7/8

(herbier, collecte entre nouaison et véraison)

Année :

1999

0106

Code clone: 01

Observateurs : Laprule .

Code cépage : Nom cépage :

SAUVAGET

Emplacement:

2R4191.95

Feuille d'herbier

oiv 076 forme des dents : côtés concaves 1 - côtés rectilignes 2 mélange notation 2 et 4 : 3 - côtés convexes 4 - un côté concave, un côté convexe 5.
oiv 077 taille des dents : très petites 1 - petites 3 - moyennes 5 - grandes 7 - très grandes 9.

oiv 077 taille des dents : très petites 1 - petites 3 - moyennes 5 - très grandes 9.
oiv 078 rapport longueur/largeur dents : très courtes 1 - courtes 3 - moyennes 5 - longues 5 - très longues 9.

oiv 079 ouverture sinus pétiolaire : très ouvert 1 - ouvert 2 peu ouvert 3 - fermé 4 - lobes chevauchants 5 - lobes très chevauchants 6.

oiv 080 forme base sinus pétiolaire : en U(1) - en accolade 2 - en V 3.

oiv 0811 dents sur bord sinus pétiolaire : absence 1 - présence assez fréquente 1 ou 2 dents 2 oiv 0812 sinus pétiolaire dégarni : absence 1 - présence fréquente sur un côté 2 - présence

oiv 0812 sinus pétiolaire dégarni : absence 1 - présence fréquente sur un côté 2) - présence fréquente sur deux côtés 3.

oiv 082 ouverture sinus latéraux supérieurs : absence sinus 1 - ouvert 2 - ferm (3) lobes chevauchants 4.

oiv 0831 forme base sinus latéraux supérieurs : en U(1) en accolade 2 - en V 3.

oiv 0832 présence deut fond sinus latéraux supérieurs : absence 1- présence fréquente 2.

Mesures ampélométriques sur feuille d'herbier

oiv 601 longueur nervure N1: très courte (<75mm) 1 - courte (105mm) 3 - moyenne (135mm) 5 -

longue (165mm) 7 - très longue (>195mm) 9. Valeur absolue (en mm) :

oiv 602 longueur nervure N2: très courte (<65mm) 1 - courte (85mm) 3 - moyenne (105mm) 5 -

longue (125mm) 7 - très longue (>145mm) 9. Valeur absolue (en mm) :

oiv 603 longueur nervure N3: très courte (<35mm) 1 - courte (55mm) 3 - moyenne (75mm) 5 -

longue (95mm) 7 - très longue (>115mm) 9. Valeur absolue (en mm) :

oiv 604 longueur nervure N4: très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 - longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9. Valeur absolue (en mm):

oiv 605 distance entre point pétiolaire et sinus supérieur (S1): très courte (<3cm) 1 - courte

(5cm) 3 - moyenne (7cm) 5 - longue (9cm) 7 - très longue (>11cm) 9. Valeur absolue (en mm)

oiv 606 distance entre point pétiolaire et sinus inférieur (S2): très courte (<3cm) 1 - courte (4,5cm) 3 - moyenne (6cm) 5 - longue (7,5cm) 7 - très longue (>9cm) 9. Valeur absolue (en mm)

oiv 607 angle entre N1 et N2 mesuré à la 1° bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °) :

oiv 608 angle entre N2 et N3 mesuré à la 1° bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °) :

oiv 609 angle entre N3 et N4: très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °):

oiv 610 angle entre N3 et la tangente entre le point pétiolaire et l'extrémité N5 : très petit 1

petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °):

oiv 611 largeur de la feuille : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 - large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) :

oiv 612 longueur de la dent N2 : très courte (<6mm) 1 - courte (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 - longue (18mm) 7 - très longue (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) :

Formulaire de description 7/8 (suite) (herbier, collecte entre nouaison et véraison)

oiv 613 largeur de la dent N2 : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm): oiv 614 longueur de la dent N4 : très étroite (66mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 longue (18mm) 7 - très longue (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm): oiv 615 largeur de la dent N4 : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) oiv 616 nbre de dents entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2 très petit 1 - petit 3 - moyer 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue : 5 oiv 617 distance entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2 très courte 1 - courte 3 - moyenne 5 - longue 7 - très longue 9. Valeur absolue (en mm) oiv 066.4* longueur nervure N5: très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9. Valeur absolue (en mm) oiv 066.5* distance entre point pétiolaire et départ N4 : très courte (<4mm) 1 - courte (8mm) 3 moyenne (12mm) 5 - longue (16mm) 7 - très longue (>20mm) 9. Valeur absolue (en mm) : oiv 079.1* ouverture/superposition du sinus pétiolaire : très ouvert (<-35mm) 1 ouvert (-15mm)(3)- fermé (-5mm)(5)- chevauchant (+25mm) 7 - très chevauchant (>+45mm) 9 Valeur absolue (en mm):

Vassal:

Angle du lobe terminal : faible (<90°) (45) moyen (=90°) 46 - grand (>90°) 47

DESIGNATION : EMPLACEMENT : Souraget Clos 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séveux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUHES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzees 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détaché .

Désignation : Emplacement : Souvaget Bord Repunie Clos 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert (8) autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Sauvaget clos Désignation : Emplacement : Bord Repuncie

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4.

subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Emplacement : Bord leprince Class

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieuro : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbr</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulcur: vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autro 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2) - autre 3.

Nº d'ordre : Sauvaget Désignation : Berd Repunier Clos 5 Emplacement : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2)- Petite 3 (dimensions: 16x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbace (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 anirrégulière 8. (dimensions : 22 × 19).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6. 27 - Très pruinée (1 / pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration regulière (1)- irrégulière 2. 28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovoide 3 - trongovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 20 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9) 29 - 4 section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5, 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 8 2 apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3) 31 - A pédicelle de couleur : verte (rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte(7) - rouge 8 - irrégulière 9. 3? - A bourrelet évident () peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9) 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.